

Por amor al arte Studio
01.03.22

Calfovit 1kg AC8492/CL0000
120 x 145 mm
6 pt



206



9123



C Gray 11



301



CALFOVIT

Polvo oral
Suplemento alimenticio
de uso animal

Invesa
Industrial Veterinaria, S.A.
a LIVISTO company
Esmeralda, 19
08950 Esplugues de Llobregat
(Barcelona) España
αESP08100210

Importado y distribuido por:
Soluciones Para El Agro Spa
Avenida Berlin N°5 Lote 20
Malloco Peñaflo, Santiago
de Chile
Fono: + 569 76953445

1 kg



Composición

1 kg contiene: Vitamina A, 600.000 UI; Vitamina D₃, 200.000 UI; Vitamina B₁, 100 mg; Vitamina B₂, 200 mg; Vitamina B₆, 10 mg; Vitamina B₁₂, 1,1 mg; Vitamina E, 75 mg; Vitamina K₃, 25 mg; Niacinamida, 1,25 g; D-Pantotenato cálcico, 500 mg; Cloruro de colina, 25 g; L-Carnitina, 3 g; DL-Metionina, 10 g; Monoclorhidrato de L-Lisina, 3,1 g; Hierro (como sulfato de hierro (II) monohidratado), 600 mg; Cinc (como sulfato de cinc monohidratado), 504 mg; Manganeso (como sulfato manganeso monohidratado), 480 mg; Cobre (como sulfato de cobre (II) pentahidratado), 125 mg; Yodo (como yoduro de potasio), 124 mg; Carbonato de calcio 443,9 g; Fosfato dicálcico, 300 g; Cloruro sódico, 25 g; Carbonato de magnesio, 5 g; Raíz de genciana, 5 g. Excipiente, c.s.

Indicaciones y especies de destino

Bovinos, ovinos y caprinos: Estados de anorexia y baja productividad, como reconstituyente y estimulante de la producción lechera.

Equinos y porcinos: Estados de anorexia y avitaminosis, como reconstituyente y en los casos de convalecencia.

Aves: Estados de anorexia y baja productividad, como reconstituyente y estimulante de la producción de huevos.

Contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones

No se han descrito.

Posología para cada especie, modo y vía de administración

Vía oral a través del pienso.

Tratamientos colectivos: Todas las especies: 3-6 kg/tonelada de pienso, durante 15-20 días.

Tratamientos individuales: Bovinos adultos: 100 g por animal y día durante 15-20 días; Terneros: 10-20 g por animal y día durante 15-20 días; Cerdas: 60 g por animal y día durante 15-20 días; Lechones: 5-10 g por animal y día durante 15-20 días; Caballos: 150 g por animal y día durante 15-20 días; Ovinos, caprinos y potros: 10-20 g por animal y día durante 15-20 días; Aves: 7 - 10 kg/tonelada de pienso, durante 15-20 días.

Tiempo de espera

No precisa.

Precauciones de conservación

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.
Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz.

Sobredosificación

Dada la composición de CALFOVIT, es prácticamente imposible que se produzcan casos de intoxicación por sobredosificación.

Información adicional

Envases de 1kg, 5 kg y 25 kg.

Es posible que no se comercialicen todos los formatos.

Uso exclusivo en la alimentación animal. No corresponde a un alimento completo.

Autorización SAG: 7387

Lote:

Fab.:

CAD:

AC8492/CL0000